



# AVERTISSEMENTS AGRICOLES TELEIMPRIMES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET  
SERVICE REGIONAL  
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
280, RUE DE FOUGERES BP 67128 35067 RENNES CEDEX

003 00089 0274A 00 031015 01904

CNEPS  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE  
DEPARTEMENT DES PERIODIQUES  
56 RUE DE RICHELIEU

75084 PARIS CEDEX 02

## EDITION CULTURES LEGUMIERES

BULLETIN N°196

RENNES LE 1 OCTOBRE 1990

### CHOUX

Dans la région de Saint Malo, des attaques de pucerons cendrés sont notées sur l'ensemble des cultures de choux-fleurs. Les attaques sont en général faibles dans les parcelles ayant déjà été protégées; cependant, une recolonisation des parcelles est notée dans pratiquement tous les cas. Les attaques sont par contre très importantes dans les parcelles non traitées ou insuffisamment protégées.

Des attaques très localisées de piérides, noctuelles et/ou teignes sont parfois trouvées. Elles sont très faibles dans tous les cas.

Une intervention est à envisager rapidement sur puceron cendré pour maintenir la protection dans les parcelles traitées et stopper les fortes infestations des parcelles non traitées. Utilisez PIRIMOR. En cas de présence simultanée de pucerons cendrés et/ou piérides, noctuelles, teignes, intervenez avec KARATE K ou complétez l'action de PIRIMOR en employant également un pyréthrinolide de synthèse (FASTAC, cyperméthrine, DECIS, KARATE, perméthrine et TALSTAR). Vérifiez la compatibilité des produits avant tout mélange. Contre les chenilles défoliatrices, traitez de préférence le soir.

### POIREAU

Dans la région de Saint Malo, quelques pustules de rouille du poireau sont observées dans les cultures. Pensez à renouveler le traitement. L'ANTRACOL bénéficie d'une autorisation de vente. BAYTAN, ETENDARD, ANVIL et TILT SP sont efficaces.